

Codice:	PREPAZ25	
Titolo del documento:	PREPARAZIONE ESOFAGO GASTRO DUODENOSCOPIA (EGDS)	
Area:	Polidiagnostico	Rev. 3 del 29/09/2025

Per una corretta preparazione lo stomaco deve essere vuoto quindi occorre non mangiare e non bere dalla mezzanotte prima dell'esame (**DIGIUNO**).

Nel caso l'esame venga effettuato nel pomeriggio il mattino presto, prima delle ore 8.00, potrà essere effettuata solo una leggera colazione.

Se deve prendere delle medicine, beva solo dei piccoli sorsi d'acqua.

NOTA BENE

Il/la paziente dovrà essere accompagnato/a da una persona in grado di guidare, comunque da una persona maggiorenne responsabile, in quanto il sedativo somministrato compromette la guida nelle ore successive l'indagine.

A causa dell'effetto sedativo dei farmaci somministrati occorrerà il riposo per 6 ore, durante le quali non bisognerà guidare, andare in bicicletta o svolgere altre attività potenzialmente pericolose.

Codice:	PREPAZ25	
Titolo del documento:	PREPARAZIONE ESOFAGO GASTRO DUODENOSCOPIA (EGDS)	
Area:	Polidiagnostico	Rev. 3 del 29/09/2025

SOSPENSIONE FARMACI ANTICOAGULANTI

Di seguito istruzioni operative per la sospensione di terapia anticoagulante orale per pazienti destinati a procedure endoscopiche potenzialmente operative:

Sospensione 48 ore prima dell'esame:

Sostanza	Nome commerciale
Dabigatran	Pradaxa
Rivaroxaban	Xarelto
Apixaban	Eliquis
Edoxaban	Lixiana

Sospensione 5/7 giorni prima dell'esame:

Sostanza	Nome commerciale
Clopidogrel	Plavix
Ticagrelor	Brilique
Prasugrel	Efient
Clopidogrel+Ac. Acetilsalicilico	Duoplavin
Ticlopidina	Tiklid

In caso di assunzione di Warfarin Sodico (**Coumadin**) o di acenocumarolo (**Sintrom**), si raccomanda di richiedere al proprio medico curante le corrette modalità di sospensione per l'esecuzione dell'esame endoscopico.

Tratto da linee guida ESGE

